

Acute epiglottitis

Aanbeveling in tekstvorm

Er wordt geen ambulante therapie gestart bij acute epiglottitis .

Epiglottitis is een urgentie en vereist **onmiddellijke opname** zodat bij evolutie naar een levensbedreigende luchtwegobstructie intubatie of tracheotomie mogelijk is.

In het ziekenhuis wordt zo snel mogelijk een intraveneuze behandeling met antibiotica gestart.

Na invoering van de Hib-vaccinatie is de incidentie van epiglottitis afgenomen en wordt epiglottitis relatief vaker bij volwassenen gediagnosticeerd.

Bron

BAPCOG 2021 Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk

Aanbeveling geraadpleegd op 24/03/2023

Beslisboom: /

Klinische scenario's, richtlijnparameters en patiëntvariabelen: /

Klinisch scenario		
Acute epiglottitis	<u>ICPC-2</u> : /	
	<u>ICD-10</u> : acute epiglottitis (J05.1)	
	<u>SNOMED CT</u> : epiglottitis (80384002), acute epiglottitis (29608009), acute bacteriële epiglottitis (21060003), acute epiglottitis met obstructie (222008), acute epiglottitis zonder obstructie (49908003), acute epiglottitis en supraglottitis bij kinderen (232432003), acute epiglottitis en supraglottitis bij volwassenen (232433008), acute epiglottitis niet veroorzaakt door streptokokken (266337001)	
Parameters	Patiënt variabelen	codering
/	/	/

Codering

Klinische scenario

Acute epiglottitis

1. ICPC-2 codering

Voor het zoeken van de ICPC 2 codes die passen bij acute epiglottitis werd eerst de thesaurus databank gebruikt. Bij het ingeven van zoekterm 'epiglottitis' werd 1 ICPC 2 code gevonden: R83 (andere infectie luchtwegen). Deze code was te weinig specifiek en kon niet worden weerhouden.

Vervolgens werd de ICPC 2 browser nagekeken, maar er werden geen bijkomende codes geselecteerd.

2. ICD-10 codering

Ook voor het zoeken van de ICD 10 codes die passen bij acute epiglottitis werd eerst de thesaurus databank gebruikt. Bij het ingeven van zoekterm 'epiglottitis' werden 2 ICD 10 codes gevonden: J05.1 (acute epiglottitis) en J37.0 (chronische laryngitis). De code J05.1 werd geselecteerd, maar de chronische laryngitis niet. Er werden bij het doorlopen van de ICD 10 browser geen bijkomende codes gevonden.

3. SNOMED CT

In snomed ct Belgium werd gezocht in de GP refset met eerst als zoekterm 'acute epiglottitis'. Dit gaf geen resultaat, maar de zoekterm 'epiglottitis' gaf wel 1 resultaat: epiglottitis (80384002). Vervolgens werd de GP refset uitgezet en werd in heel SNOMED CT Belgium gezocht naar 'acute epiglottitis'. Dit gaf 7 resultaten: acute epiglottitis (29608009), acute bacteriële epiglottitis (21060003), acute epiglottitis met obstructie (222008), acute epiglottitis zonder obstructie (49908003), acute epiglottitis en supraglottitis bij kinderen (232432003), acute epiglottitis en supraglottitis bij volwassenen (232433008), acute epiglottitis niet veroorzaakt door streptokokken (266337001).

Beslistabel

0 richtlijnparameters: 2⁰ mogelijkheden

#	Beslissing
---	------------

1	AB 1
---	------

Gestructureerde aanbevelingen (respons) in functie van richtlijn klinisch scenario

Aanbeveling 1 (AB1): epiglottitis

	Hospitalisatie	Epiglottitis is een urgentie en vereist onmiddellijke opname zodat bij evolutie naar een levensbedreigende luchtwegobstructie intubatie of tracheotomie mogelijk is. Het voorschrijven van een ambulante therapie met antibiotica is niet aangewezen omdat onmiddellijke opname vereist is.
	Penicillines	Niet aangewezen
	Cefalosporines	Niet aangewezen
	Chinolonen	Niet aangewezen
	Macroliden	Niet aangewezen

Versie aanpassingen

Gebaseerd op opmerkingen van expertenpanel en na intern overleg

Datum	Wat	Waar
30/6/2024	Extra info werd toegevoegd: Het voorschrijven van een ambulante therapie met antibiotica is niet aangewezen omdat onmiddellijke opname vereist is. Versie 1.1 werd versie 1.2	AB1